

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数		
移植水稻 直播水稻	-	一年生雑草	耕起20～10 日前（雑草 生育期）	400～600ml /10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散 布	2回以内	1回		
麦類(小麦を除く)			耕起7日前ま で（雑草生 育期）							3回以内	2回以内
小麦			は種後出芽 前（雑草生 育期）								
				耕起前（雑 草生育期）		500～1000m L/10a		2回以内			
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生及び多年 生雑草	雑草生育期 (草丈50cm 以下)	400～600ml /10a	1回				1回	1回	
水田作物(水田畦 畔)	水田畦畔		収穫14日前 まで（雑草 生育期：草 丈30cm以下)								
水田作物(水田刈 跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	500～2000m L/10a	1回			1回	1回		
		多年生雑草									

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
水田作物(水稲を除く)	-	一年生雑草	耕起20～10日前(雑草生育期)	400～600ml/10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布	2回以内	1回
キャベツ			耕起前又は定植7日前まで(雑草生育期：草丈30cm以下)					1回	
だいこん			耕起前又は種7日前まで(雑草生育期：草丈30cm以下)					2回以内	
はくさい			耕起前又は定植7日前まで(雑草生育期：草丈30cm以下)					1回	

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
えだまめ	-	一年生雑草	耕起前又はは種10日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）	400～600ml/10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内	4回以内
たまねぎ(秋播移植栽培)			耕起又は定植7日前まで（雑草生育期）			3回以内			3回以内
		スズメノカタビラ 一年生広葉雑草	定植後畦間処理：雑草生育期（但し、収穫30日前まで）						
ねぎ		一年生雑草	耕起前又は定植7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）						

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
ねぎ	-	一年生雑草	定植後畦間処理：雑草生育期（但し、収穫30日前まで）	400～600ml/10a	100L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内	3回以内
果樹類（かんきつ、キウイフルーツ、パイナップルを除く）		一年生及び多年生雑草	収穫7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）	400～1000ml/10a					
かんきつ						5回以内			
きく		一年生雑草	耕起前又は定植前まで（雑草生育期：草丈50cm以下）	400～600ml/10a	2回以内	2回以内		2回以内	
だいず			畦間処理：雑草生育期（草丈30cm以下）（但し、収穫前日まで）				4回以内	4回以内	

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
だいず	-	一年生雑草	は種後出芽前（雑草生育期：草丈30cm以下）	400～600ml/10a	100L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	4回以内	4回以内
			耕起前又はは種10日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）						
樹木等	公園、庭園、堤とう、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等	スギナ	雑草生育期（草丈30cm以下）	1000～4000ml/10a		3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内	3回以内
		一年生及び多年生雑草	雑草生育期（草丈50cm以下）	500～1000ml/10a					

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

適用雑草と使用方法

2017年10月11日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
牧草	牧野・草地	一年生及び多年生雑草	更新・造成10日前まで（雑草生育期）	400～750ml /10a	100L/10a	1回	雑草茎葉散布	3回以内	2回以内
茶	-		摘採7日前まで（雑草生育期）	400～600ml /10a				2回以内	

サンダーボルト007（グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤）

2017年10月11日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用目的	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生及び多年生雑草	草丈抑制による刈込軽減	雑草生育期又は刈取後再生期（但し、収穫14日前まで）	50～150ml/10a	100L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内	2回以内